

Bijlage 5 Literatuurselectie vraag b

Richtlijn virale luchtweginfecties | Uitgangsvraag 2 - Diagnostiek


In- en exclusiecriteria

Inclusiecriteria	Exclusiecriteria
Patiënten met (een verdenking van) een virale luchtweginfectie: • Woonachtig in verblijf waarin zorg wordt verleend (zoals verpleeghuis, woonzorgcentrum, kleinschalige woonvormen, eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatie); of • (Kwetsbare) ouderen met een leeftijd ≥ 70 jaar of gemiddelde/mediaan ≥ 80 jaar; of • Woonachtig in verblijf waarin zorg wordt verleend (zoals gehandicaptenzorginstelling, woonzorgcentrum, kleinschalige woonvormen)	Studies naar Covid-19: • Die vóór november 2021 de dataverzameling hebben uitgevoerd. Vanaf eind 2021 is de coronavariant Omikron wereldwijd dominant; • Die betrekking hebben op de alfavariant, bètavariant, gammavariant en/of deltavariant
Virale luchtweginfectie veroorzaakt door SARS-Cov-2 (variant Omikron, B.1.1.529), Influenzavirus, RS-virus en/of humaan metapneumovirus (hMPV)	Patiënten met een lage luchtweginfectie (zoals: bronchitis, tracheïtis, pneumonie)
Interventie is een POCT-test	Patiënten met een bacteriële luchtweginfectie
Bevestigde virale luchtweginfectie middels een PCR-test	Studies met controle anders dan middels PCR-test
Minimaal één van de uitkomstmaten	

Resultaat literatuurselectie

Resultaten
literatuuronderzoek in
Ovid/Medline en
Embase: n = 839





Geëxcludeerde studies op basis van full-tekst

Eerste auteur, jaartal	Reden van exclusie (één reden genoemd, meerdere redenen kunnen van toepassing zijn)
Boyanton, 2014 ⁴	Niet de juiste populatie
Caram, 2009 ⁵	Niet de juiste interventie
D'Heilly, 2008 ⁶	Niet de juiste populatie
MacDonald, 2022 ⁷	Niet de juiste populatie
Nicholson, 2014 ⁸	Niet de juiste populatie
Onwuchekwa, 2023 ⁹	Niet de juiste populatie
Zuurbier, 2022 ¹⁰	Niet de juiste populatie